

乳幼児期にうける定期予防接種一覧（小学校就学前まで）

（令和5年度）

種類	予防する病気	対象年齢 (法定接種の範囲)	標準接種年齢	接種回数	箕輪町の 通知時期
ヒブ (Hib) ワクチン	インフルエンザ 菌 b 型 (Hib) 感 染症	生後 2 か月～ 5 歳未満	生後 2 ～ 7 か月 に接種開始	(初回接種) 27 日以上の間隔で 3 回	出生の 翌月末
				(追加接種) 初回終了後、7 か月以上 あけて 1 回	
小児用肺炎球菌 ワクチン	小児の肺炎球菌 感染症	生後 2 か月～ 5 歳未満	生後 2 ～ 7 か月 に接種開始	(初回接種) 27 日以上の間隔で 3 回	出生の 翌月末
				(追加接種) 初回終了後 60 日以上あけて、 1 歳～1 歳 3 か月の間 に 1 回	
4 種混合	ジフテリア・百 日せき・破傷 風・急性灰白髄 炎（小児マヒ）	生後 2 か月～ 7 歳半未満	生後 2 か月～ 2 歳半	(初回接種) 20 日以上の間隔で 3 回	出生の 翌月末
				(追加接種) 初回終了後、6 か月以上 あけて 1 回	
B 型肝炎	B 型肝炎	生後 2 か月～ 1 歳未満	生後 2 か月～ 9 か月	2 回目は 1 回目から 27 日 以上の間隔をおいて。3 回 目は 1 回目～139 日以上 の間隔をあけて	出生の 翌月末
BCG	結核	生後 1 歳未満	生後 5 ～ 8 か月	1 回	出生の 翌月末
ロタウイルス ワクチン (2 種類のワクチ ンから選んで 接種) ロタリックス 又は ロタテック	ロタウイルス感 染による胃腸炎	ロタリックス (1 価) 出生 6 週 0 日後～ 24 週 0 日後まで	1 回目の接種を 生後 2 か月～ 出生 14 週 6 日 後までに接種	1 回目と 2 回目の間を 27 日以上空けて 2 回 (経口)	出生の 翌月末
		ロタテック (5 価) 出生 6 週 0 日後～ 32 週 0 日後まで		それぞれの回で 27 日以上 空けて 3 回 (経口)	
麻しん風しん 混合	はしか 風しん	(1 期) 満 1 歳～2 歳未満	(1 期) 生後 1 歳～2 歳 の誕生日の前日	1 回	1 歳の 誕生日
		(2 期) 満 5 歳～7 歳未満	(2 期) 小学校就学前 1 年間	1 回	保育園 年長児
水痘 (水ぼうそう)	水痘 (水ぼうそう)	生後 1 歳～ 3 歳未満	生後 1 歳～2 歳	3 か月以上の間隔で 2 回	1 歳の 誕生日
日本脳炎	日本脳炎	(1 期初回) 生後 6 か月 ～7 歳半未満	(1 期初回) 3 歳～4 歳 <年少児相当>	6 日以上の間隔で 2 回	3 歳の 誕生日
		(1 期追加) 生後 6 か月 ～7 歳半未満	(1 期追加) 4 歳～5 歳 <年中児相当>	1 期初回終了後 6 か月以上 あけて 1 回	

※令和5年4月1日現在の状況です。

予防接種法の改正などにより変更となることがありますのでご了承ください。