

# 乳幼児期にうける定期予防接種一覧（小学校就学前まで）

（令和8年度）

種類	予防する病気	対象年齢 （法定接種の範囲）	標準接種年齢	接種回数	通知発送 時期
小児用肺炎球菌 ワクチン	小児の肺炎球菌 感染症	生後2か月～ 5歳未満	生後2～7か月 に接種開始	（初回接種） 27日以上の間隔で3回	出生の 翌月末
				（追加接種） 初回終了後60日以上あけて、 1歳～1歳3か月の間に1回	
5種混合	ジフテリア 百日せき・破傷 風・急性灰白髄 炎（小児マ ヒ）・ インフルエンザ 菌b型（Hib） 感染症	生後2か月～ 7歳半未満	生後2か月～ 2歳半	（初回接種） 20日以上の間隔で3回	出生の 翌月末
				（追加接種） 初回終了後、6か月以上 あけて1回	
B型肝炎	B型肝炎	生後2か月～ 1歳未満	生後2か月～ 9か月	2回目は1回目から27日 以上の間隔をおいて。3回 目は1回目～139日以上 の間隔をあけて	出生の 翌月末
BCG	結核	生後1歳未満	生後5～8か月	1回	出生の 翌月末
ロタウイルス ワクチン （2種類のワクチ ンから選んで 接種） ロタリックス 又は ロタテック	ロタウイルス感 染による胃腸炎	ロタリックス（1 価） 出生6週0日後～ 24週0日後まで	1回目の接種を 生後2カ月～ 出生14週6日 後までに接種	1回目と2回目の間を27 日以上空けて2回（経口）	出生の 翌月末
		ロタテック（5価） 出生6週0日後～ 32週0日後まで		それぞれの回で27日以上 空けて3回（経口）	
麻しん風しん 混合	はしか 風しん	（1期） 満1歳～2歳未満	（1期） 左に同じ	1回	1歳の 誕生月の 前月
		（2期） 年長児相当	（2期） 左に同じ	1回	年長児相 当の年度 4月
水痘 （水ぼうそう）	水痘 （水ぼうそう）	生後1歳～ 3歳未満	生後1歳～2歳	3か月以上の間隔で2回	1歳の 誕生月の 前月
日本脳炎	日本脳炎	（1期初回） 生後6か月 ～7歳半未満	（1期初回） 3歳～4歳 <年少児相当>	6日以上の間隔で2回	3歳の 誕生月の 前月
		（1期追加） 生後6か月 ～7歳半未満	（1期追加） 4歳～5歳 <年中児相当>	1期初回終了後6か月以上 あけて1回	

※令和8年4月1日現在の状況です。

予防接種法の改正などにより変更となる場合がありますのでご了承ください。